

QUINCE A YARI BODUR ARMUT ANACI

Yaygın olarak kullanılır. 3 m – 6 m arasında ağaç yapar. Verimli topraklarda az verim veren çeşitlere oranla daha fazla verim yapar. Düzenli budama gerektirir. Başta William's olmak üzere bazı armut çeşitleri ile tam uyummadığından ara anaç kullanma zorunluluğu doğurur. Beurre Hardy kültür armut çeşidi, bu anacın William's ile uyumsuzluğunun giderilmesinde ara anaç olarak kullanılmaktadır. % 3-4'ün üzerinde kireç ihtiva eden topraklarda kloroza hassastır. Quince A ince anaçları bazı armut çeşitleri ile uyumsuzluk gösterir.

Quince A anacı ile aşı uyumsuzluğu gösteren çeşitler için Beurre Hardy yada Old Home armut çeşitleri ara anaç olarak kullanılmalıdır. Quince A anacı ile aşı uyumsuzluğu gösteren çeşitler, Bartlet (Williams), Beurre Bosc, Conference, Coscia, Farmingdale, Dr. Jule Guyot, Deveci ve Asya armutlarıdır.

Quince A anacı ile uyumsuzluğu gösteren çeşitler ise; Beurre Hardy, Old Home, Abete Fetel, Santa Maria, Conference, Passe Crassane, Akça armutlarıdır. Ayva kökenli MC, Sydo gibi anaçlar batılı ülkelerde denemiş olup sık dikime uygun bu anaçlar kullanılmaya başlanılmıştır. MC anacı orta kuvvetli gelişen, yüzlek kök sis temine sahip üzerindeki çeşidi erken meyveye yatıran bir anaçtır. Dikimi takip eden 2. yılda ürün alınmaya başlanılmakta olup verim yönünden de başarılı sonuçlar alınmıştır.

BAĞLAR	AGAÇ GELİŞME KUVVETİ	KIRECE DAYANIM	TABAN SUYUNA DAYANIM	KURAGA MUKAVEMET
HF 333	██████████	████	████	████
us Dwarf	████	██████	██████	████
Fox 11	██████████	██████	██████	██████
BA 29	██████	████	████	████
MC	████	████	██████	████

ARMUT ANAÇLARININ OLUŞTURDUĞU AĞAÇ TAÇ HAC



